

## Management enge Kontaktpersonen (KP) und Infizierter in Schulen

### Entscheidungsgrundlage für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

#### Vorgehen Schulen

##### 1 Infizierte (PCR-positive) SuS und Lehrkräfte (symptomatisch und asymptomatisch)

- Isolierung für 10 Tage ohne abschließenden Test
- Verkürzung der Isolationsdauer auf 7 Tage möglich, wenn zuvor 48 Stunden Symptomfreiheit bzw. nachhaltige Besserung der Symptomatik und am Tag 7 abgenommener, negativer Ag-Test\*
- Info an alle Eltern über Auftreten einer COVID-Infektion in der Einrichtung

##### 2 Enge Kontaktpersonen zum Indexfall

- Testung der gesamten Kohorte (SuS und Lehrkräfte) mittels Ag-Test\* unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus
  - Symptomatische enge Kontaktpersonen (unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus) benötigen eine Abklärung der Symptome mittels PCR (Diagnostik über Haus- oder Kinderarzt veranlassen).
- Negativ getestete asymptomatische SuS sowie Lehrer der Kohorte ist der Besuch der Einrichtung weiter möglich. Folgende Grundsätze sollten nach Möglichkeit unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus eingehalten werden (RKI: „Da auch geimpfte und genesene Personen sich infizieren und SARS-CoV-2 übertragen können (wenn auch in geringerem Ausmaß), sollten diese in die Teststrategie eingeschlossen sein“):
  - Testung an 5 aufeinanderfolgende Schultagen\*\* nach letztem Kontakt zum Indexfall bzw. jedem weiteren Fall. Nach Ablauf von 5 Tagen ohne Folgefall ist Rückkehr zum regulären Testregime und Schulbetrieb möglich.
  - MNS wird während der gesamten Schulzeit getragen.
  - Tägliche Symptomkontrolle für 14 Tage nach letztem Kontakt zum Fall.
  - Bei Entwicklung von Symptomen kein Besuch der Einrichtung und diagnostische Abklärung mittels PCR.
  - Kontakte im privaten Bereich reduzieren (keine Vereine, keine Musikschule o. ä., kein Besuch vulnerabler Gruppen)
- Ausgenommen von der Quarantäne sind SUS sowie Lehrkräfte, solange sie symptomfrei sind (o.g. Maßnahmen sind trotzdem einzuhalten):
  - a. mit einer Auffrischungsimpfung (Boosterung), insgesamt drei Impfungen erforderlich (auch bei jeglicher Kombination mit COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)
  - b. Geimpfte Genesene (Geimpfte mit einer Durchbruchinfektion oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben)

\*PEI-gelisteter Ag-Test mit hinreichender Sensitivität [Paul-Ehrlich-Institut - Homepage - Tabellen: Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigen Schnelltests \(Selbsttests + Schnelltests\) \(Stand 12.01.2022\) \(pei.de\)](#)

\*\* wenn tgl. Ag-Testung nicht toleriert wird, ist eine Quarantäne von 10 Tagen erforderlich, diese kann mit einem neg. Ag-Test nach 5 Tagen verkürzt werden

- c. Personen mit einer zweimaligen Impfung, ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung, gilt auch für COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)
- d. Genesene ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests

Eine einmalige Impfung mit der COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) begründet keine Ausnahme von der Quarantäne

\*PEI-gelisteter Ag-Test mit hinreichender Sensitivität [Paul-Ehrlich-Institut - Homepage - Tabellen: Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests \(Selbsttests + Schnelltests\) \(Stand 12.01.2022\) \(pei.de\)](#)

\*\* wenn tgl. Ag-Testung nicht toleriert wird, ist eine Quarantäne von 10 Tagen erforderlich, diese kann mit einem neg. Ag-Test nach 5 Tagen verkürzt werden

Stand: 17.01.22